

ゆび
指さしで使える言葉
こま 困ったときに ゆび 指さしで つか 伝えよう！ こと ば
医療編③

- | 日本語 |
|------------------------------|
| 1 錠剤 |
| 2 粉末 |
| 3 水薬 |
| 4 カプセル |
| 5 座薬 |
| 6 湿布薬 |
| 7 食前に服用する |
| 8 食後に服用する |
| 9 クリームを塗る |
| 10 痛い時や熱が 38 度以上あるときに飲んでください |
| 11 症状が無くなっても、薬は最後まで服用してください |

- | English | 英語 |
|---|----|
| 1 Tablet | |
| 2 powder | |
| 3 liquidmedicine | |
| 4 capsule | |
| 5 suppository | |
| 6 compress,poultice | |
| 7 Take (use) this medicine before meals. | |
| 8 Take (use) this medicine after meals. | |
| 9 Rub this cream on. | |
| 10 Take this medicine if you have pain, or if you have a fever of 38 degrees or more. | |
| 11 Even if your symptoms go away, finish all the medicine as prescribed. | |

- | Tagalog | タガログ語 |
|---|-------|
| 1 Tableta | |
| 2 Pulbos | |
| 3 Likidong gamot | |
| 4 Kapsul | |
| 5 Suppository | |
| 6 Gamot pantapal (hal.salonpas) | |
| 7 Inumin bago kumain | |
| 8 Inumin pagkatapos kumain | |
| 9 Maglagay ng pamahid | |
| 10 Inumin kapag nakaramdam ka ng sakit o kapag may lagnat na higit sa 38°C. | |
| 11 Mawala man ang sintomas ng sakit, inumin o ubusin ang iniresetang gamot. | |

韓国・朝鮮語

- | |
|---------------------------------|
| 1 알약(정제약) |
| 2 가루약 |
| 3 물약 |
| 4 캡슐 |
| 5 좌약 |
| 6 습포약(파스) |
| 7 식사전에 먹는다
(복용한다) |
| 8 식사후에 먹는다
(복용한다) |
| 9 크림을 바른다 |
| 10 아플때 또는 열이 38 도 이상 오르면 복용하십시오 |
| 11 증상이 좋아져도 지시된 약은 끝까지 복용하십시오 |

中国语

- | |
|-----------------------|
| 1 药片 |
| 2 粉末 |
| 3 药水 |
| 4 胶囊 |
| 5 坐药 |
| 6 贴的膏药 |
| 7 饭前服用 |
| 8 饭后服用 |
| 9 涂膏药 |
| 10 疼痛时或发烧超过 38 度以上时服用 |
| 11 即使症状有所好转，也请服用到最后 |

ゆび
指さしで使える言葉
こま
困ったときに 指さしで 伝えよう！

こと
ば
い りょう へん
医療編③

日本語

- 1 錠剤
- 2 粉末
- 3 水薬
- 4 カプセル
- 5 座薬
- 6 湿布薬
- 7 食前に服用する
- 8 食後に服用する
- 9 クリームを塗る
- 10 痛い時や熱が 38 度以上あるときに飲んでください
- 11 症状が無くなっても、薬は最後まで服用してください

Español

- 1 Pastilla
- 2 Polvo
- 3 Medicamentolíquido
- 4 Cápsula
- 5 Supositorio
- 6 Compresa húmeda
- 7 Tomar medicamento antes de la comida
- 8 Tomar medicamento después de la comida
- 9 Aplicar ungüento
- 10 Tome el medicamento cuando tenga dolor o más de 38 grados de fiebre.
- 11 Tome todos los medicamentos (hasta el último) aunque los síntomas hayan cesado.

スペイン語


Português

ポルトガル語

- 1 comprimido
- 2 remédio em pó
- 3 remédio líquido
- 4 cápsula
- 5 supositório
- 6 emplastro
- 7 tomar o remédio antes da refeição
- 8 tomar o remédio após a refeição
- 9 passar o creme
- 10 tomar o remédio quando sentir dor ou tiver febre acima de 38°C
- 11 tomar o remédio até o fim, mesmo que melhore

やさしい日本語

1 錠剤



2 粉末



3 水薬



4 カプセル



5 座薬



6 湿布薬



7 食前に服用する



8 食後に服用する



9 クリームを塗る



10 痛い時 または 熱が 38 度以上あるとき の 飲んでください。



11 病気が なおったと思っても もらった薬は お 終わりまで の 飲んでください。

